

Schrödingerjeva enačba

Kaj so vedeli na začetku?

- i) $E = \hbar\omega = h\nu$ (Bohr, Einstein)
- ii) $p = \hbar k; k = \frac{2\pi}{\lambda}$ (de Broglie)
- iii) $E = p^2/2m$
- iv) Vse skupaj je nekakšno valovanje

Kakšne enačbe pa so poznali v tistem času?

a) Valovna enačba

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

Vzamemo nastavek $u = u_0 \cos(kx - \omega t)$ in vstavimo.

$$-k^2 = -\frac{\omega^2}{c^2} \Rightarrow \omega = \pm c|k|$$

Energija je sorazmerna z ω , gibalna količina pa z k . Skupaj tu dobimo napačno sorazmernost $E \propto p$. Torej valovna enačba nam ne pomaga.

b) Difuzijska enačba

$$D \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{\partial T}{\partial t}$$

Vzemimo nastavek za stoječi val $T = T_0 \cos kx \cos \omega t$ in vstavimo.

$$-k^2 D T(x, t) = -\omega T_0 \sin \omega t \cos kx$$

Dobljeno ni sorazmerno z $T(x, t)$ torej ne moremo funkcije pokrajšati na obeh straneh. Vzemimo raje nastavek $T = T_0 e^{i(kx - \omega t)}$ in ga vstavimo.

$$D = \frac{i\omega}{k^2} = \frac{i\hbar^2 k^2}{\hbar 2mk^2} = i \frac{\hbar}{2m} \Rightarrow E = \frac{p^2}{2m}$$

Tokrat pa dobimo pravi izraz za energijo. Takšna enačba velja za prosti delec. Dodamo če potencial če delec ni prost in dobimo **Schrödingerjevo enačbo**

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V(x, t)\psi; \quad \psi(x, t)$$

Kaj je ψ ?

Vzemimo nastavek z realno in imaginarno komponento

$$\psi = \alpha + i\beta; \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

To vstavimo v Schrödingerjevo enačbo

$$i\hbar(\dot{\alpha} + i\dot{\beta}) = -\frac{\hbar^2}{2m}(\alpha'' + i\beta'') + V(\alpha + i\beta)$$

Iz tega dobimo sistem dveh realnih sklopljenih diferencialnih enačb (kjer smo po tihu privzeli, da je **potencial V realen**).

$$-\hbar\dot{\beta} = -\frac{\hbar^2}{2m}\alpha'' + V\alpha$$

$$\hbar\dot{\alpha} = -\frac{\hbar^2}{2m}\beta'' + V\beta$$

Max Born je to interpretiral tako, da je ψ^2 verjetnostna gostota za detekcijo delca v volumnu dV . **ψ je verjetnostna amplituda.**

$$|\psi(\vec{r}, t)|^2 = \alpha^2(\vec{r}, t) + \beta^2(\vec{r}, t) = \rho(\vec{r}, t)$$

$$dP(\vec{r}, t) = \rho dV$$

Kaj pa je \vec{r} ?

To **ni** koordinata delca. Mi vemo lahko le verjetnost, da pri \vec{r} detektiramo delec [Poglej sliko]. Ta enačba nič nima z delcem, ampak samo z verjetnostjo izida eksperimenta. **Kvantna mehanika ne opisuje delcev direktno.**

Kontinuitetna enačba za verjetnost

To da delec **je** nekje pravzaprav skrijemo v normalizacijo, ko integriramo po celem prostoru.

$$P = \int_{-\infty}^{\infty} \rho(\vec{r}, t) = 1; \quad \forall t$$

Splošno kontinuitetno enačbo poznamo

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = q$$

Preverimo to kontinuitetno enačbo za našo gostoto

$$\frac{\partial}{\partial t} |\psi|^2 = \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \psi + \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

Odvida izrazimo iz Schrödingerjeve enačbe in iz konjugirane Schrödingerjeve enačbe

$$\frac{\partial}{\partial t} |\psi|^2 = -\frac{\hbar^2}{2m(-i\hbar)} \left(\frac{\partial^2 \psi^*}{\partial x^2} \right) \psi + \frac{V^*}{-i\hbar} \psi^* \psi + \text{complex conjugate}$$

Poračunajmo

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi^*\right) \psi = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \psi^*}{\partial x} \psi\right) - \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial x}$$

Teko je

$$\frac{\partial}{\partial t} |\psi|^2 = -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\hbar}{2im} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial x}\right)\right) - \frac{2}{\hbar} \text{Im}(V) |\psi|^2$$

Prepoznamo člene kot člene kontinuitetne enačbe (divergenca v 1D je le odvod po x). Tako je

$$\vec{j} = \frac{\hbar}{2im} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial x}\right)$$

$$q = -\frac{2}{\hbar} \text{Im}(V) |\psi|^2$$

V našem primeru, kjer prevzemamo, da je potencial realen potem vedno velja $q = 0$. Če pa bi imeli recimo opravka z optičnim potencialom, bi bil pa ta člen neničelen. Npr. Neidealno steklo, ki absorbira svetlobo in se mu spreminja lomni količnik opišemo z kompleksnim lomnim količnikom.

Lastnosti valovne funkcije

Normalizacija

Vemo, da vedno velja

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx = 1; \quad \forall \psi \in \mathbb{C}$$

Ampak kaj pa če funkcija narašča v neskončnosti namesto da pada? Poglejmo primer $\psi = Cx^2 e^{-x^2 \sin^2 x}$. Sinus ima ničle pri $x_n = \pi n$. To dejansko uspemo normirati za $C < \infty$, tudi če funkcija ne gre proti 0 v $\pm\infty$. Sicer pa tipično pa velja

$$\psi(x, t) \rightarrow_{|x| \rightarrow \infty} 0$$


ker narava tako deluje. Po navadi delujemo v **Schwartzovem prostoru (hitro padajočih funkcij)**. Te padajo hitreje kot vsak polinom.

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^n |\psi|^2 dx = C < \infty; \quad \forall n$$

Pričakovana vrednost, povprečna vrednost in hitrost težišča porazdelitve

Pričakovano vrednost x izračunamo kot

$$\langle x \rangle = \int x p dx = \int \psi^*(x, t) x \psi(x, t) dx$$



Poglejmo si sedaj hitrost težišča porazdelitve

$$v_T = \frac{d}{dt} \langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\partial \psi^*}{\partial t} x \psi + \psi^* \frac{\partial x}{\partial t} \psi + \psi^* x \frac{\partial \psi}{\partial t} \right) dx =$$

Odvode po ψ spet izrazimo iz Schrödingerjeve enačbe. Odvod $\partial x / \partial t$ pa je 0.

$$= \frac{\hbar^2}{2mi\hbar} \int \left(\frac{\partial^2 \psi^*}{\partial x^2} x \psi - \text{complex conjugate} \right) dx = (*)$$

Naredimo vmesni korak in spravimo odvod na prvi odvod

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \psi^*}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \psi^*}{\partial x} x \psi \right) - \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \psi - \frac{\partial \psi^*}{\partial x} x \frac{\partial \psi}{\partial x} \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \psi^*}{\partial x} x \psi \right) - \frac{\partial}{\partial x} (\psi^* \psi) + \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x} \left(\psi^* x \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) + \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} + \psi^* x \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \end{aligned}$$

To lahko potem uporabimo da zapišemo

$$= \frac{\hbar^2}{2i\hbar m} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \psi^*}{\partial x} x \psi - |\psi|^2 - \psi^* x \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) dx + \frac{1}{m} \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi \right) dx$$

Zeleno obarvani člen (prvi integral) gre proti 0 v $\pm\infty$. Tako dobimo

$$m \frac{d\langle x \rangle}{dt} = \int \psi^* \hat{p} \psi dx$$

kjer smo uvedli **operator gibalne količine** (to ni od delca ampak kolokvialno tako rečemo)

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \quad \text{oz.} \quad \hat{\psi} = -i\hbar \nabla$$

To lahko prepišemo z pričakovano vrednostjo operatorja gibalne količine, da dobimo

$$\langle \hat{p} \rangle = m \frac{d\langle \hat{x} \rangle}{dt}$$

Operatorji

V kvantni mehaniki vsaki merljivi vrednosti, opazljivki, pripada ustrezen operator. Naj bo $f(z) = \sum_n c_n z^n$ neka analitična funkcija. Definiramo funkcijo **operatorja** kot

$$f(\hat{A}) = \sum_n c_n \hat{A}^n$$

Še posebej preprosto je, ko delujemo na nek lastni vektor $\hat{A}\psi = a\psi$

$$f(\hat{A})\psi = \sum_n c_n \hat{A}^n \psi = \sum_n c_n a^n \psi = f(a)\psi$$

Primer: [Eksponent operatorja]

$$e^{\hat{A}} = 1 + \hat{A} + \frac{1}{2!}\hat{A}^2 + \dots + \frac{1}{n!}\hat{A}^n + \dots$$

Primeri nekaj operatorjev

$$\hat{x} = x$$

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$$

$$\hat{p}^2 = \hat{p}\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) = (-i\hbar)^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

$$\hat{p}^n = (-i\hbar)^n \frac{\partial^n}{\partial x^n}$$

$$\hat{V} = V(x, t)$$

Definirajmo tu še **Hamiltonov operator**

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}$$

Komutatorji

Imejmo operatorje $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$. **Komutator med \hat{A} in \hat{B}** definiramo kot

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

Lastnosti

- i) $[\lambda\hat{A}, \hat{B}] = \lambda[\hat{A}, \hat{B}]; \lambda \in \mathbb{C}$
- ii) $[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]$
- iii) $[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}$ (nujno zadaj!)
- iv) $[\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] + [\hat{B}, [\hat{C}, \hat{A}]] + [\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0$
- v) **Baker-Hausdorffova lema**

$$e^{\hat{A}}\hat{B}e^{-\hat{A}} = \hat{B} + [\hat{A}, \hat{B}] + \frac{1}{2!}[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] + \dots + \frac{1}{n!}[\hat{A}, [\hat{A}, [\dots, \hat{B}] \dots]] + \dots$$

Primer: Komutator med \hat{x} in \hat{p}

Naj bo $\hat{A} = \hat{x}$ in $\hat{B} = \hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$. Vzamemo splošno funkcijo $f(x)$ in pogledamo, kaj naredi operator.

$$\begin{aligned} [\hat{x}, \hat{p}]f(x) &= x \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) f - \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) (xf) = \\ &= -i\hbar \frac{\partial f}{\partial x} + i\hbar f + i\hbar x \frac{\partial f}{\partial x} = i\hbar f \end{aligned}$$

Torej smo tako izračunali da velja

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \quad \text{in} \quad [\hat{p}, \hat{x}] = -i\hbar$$

V 3D pa velja

$$[\hat{x}_\alpha, \hat{p}_\alpha] = i\hbar \delta_{\alpha\beta}$$

Lastnosti \hat{p} in \hat{H}

Naj bosta φ in ψ poljubni funkciji.

Operator $\hat{A} = \frac{\partial}{\partial x}$ je anti-simetričen/anti-hermitski

Za dokaz uporabimo integracijo per partes.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi \left(\frac{\partial}{\partial x} \right) \psi dx = \varphi \psi \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \psi \left(\frac{\partial}{\partial x} \right) \varphi = 0 - \int_{-\infty}^{\infty} \psi \left(\frac{\partial}{\partial x} \right) \varphi$$

To velja, ker za valovne funkcije smo rekli, da grejo proti 0 v $\pm\infty$.

Operator $\hat{A}^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2}$ je simetričen/hermitski

Uporabimo dvakrat isti trik kot prej.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \psi dx = 0 - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial x} dx = 0 - \left(- \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \psi dx \right) = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \varphi \psi dx$$

Operator \hat{p} simetričen/hermitski

Uporabimo enkrat isti trik kot prej, kjer tukaj v upoštevanje pride še kompleksna konjugacija.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi^* \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi dx = 0 - \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\partial \varphi^*}{\partial x} \right) (-i\hbar \psi) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \varphi \right)^* \psi dx = \int_{-\infty}^{\infty} (\hat{p}\varphi)^* \psi dx$$

Intermezzo: Lastnosti ψ (ne vem zakaj smo to ravno tu še enkrat naredili)

i) **Normalizacija**

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx = 1$$

ii) **Zveznosti ψ**

iii) **Zveznost ψ'**

Integrirajmo SE:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \int_a^b \psi dx &= -\frac{\hbar^2}{2m} \int_a^b \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} dx + \int_a^b V \psi dx \\ i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} (b-a) &= -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \Big|_b - \frac{\partial \psi}{\partial x} \Big|_a \right) + \psi \int_a^b V dx \end{aligned}$$

Sedaj pošljemo $b \rightarrow a$

$$0 = -\frac{\hbar^2}{2m} (\psi'(b) - \psi'(a)) + \psi \int_a^b V dx$$

Vidimo torej, da če je **potencial V zvezen** je **zvezen tudi ψ'** . ψ' ima skok če je $V \propto \delta$ recimo $V(x) \sim \lambda \delta(x)$.

iv) **Zveznost ψ''**

Če ima V **skok** v točki x , **ga ima tudi ψ''** .

Časovni odvod pričakovane vrednosti in Erhenfestov teorem (1927)

Hočemo »kot 2.NZ« za kvantno mehaniko (**Pazi:** obstaja razlika, ampak je velikokrat zanemarljiva). Imamo \hat{A}, ψ in računamo $\langle \hat{A} \rangle$. Zanima nas odvod.

$$\langle \hat{A} \rangle = \int \psi^* \hat{A} \psi dx$$
$$\frac{d}{dt} \langle \hat{A} \rangle = \int \left(\frac{\partial \psi^*}{\partial t} \hat{A} \psi + \psi^* \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \psi + \psi^* \hat{A} \frac{\partial \psi}{\partial t} \right) dx$$

Časovne odvode lahko zopet izrazimo iz SE:

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{1}{i\hbar} \hat{H} \psi$$
$$\frac{\partial \psi^*}{\partial t} = -\frac{1}{i\hbar} \hat{H} \psi^*$$

Izrazimo odvode in imamo

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{A} \rangle = \left\langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right\rangle + \frac{1}{i\hbar} \int ((-\hat{H}\psi)^* \hat{A} \psi + \psi^* \hat{A} \hat{H} \psi) dx =$$

\hat{H} je **hermitski** operator, torej lahko deluje na levo ali na desno (to spet velja samo za funkcije, ki grejo v neskončnosti proti nič, kar VF so). Tako lahko obrnemo vrstni red v pri zeleno označenem.

$$= \left\langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right\rangle + \frac{1}{i\hbar} \int (\psi^* \hat{A} \hat{H} \psi - \psi^* \hat{H} \hat{A} \psi) dx$$

Tu pa prepoznamo pričakovano vrednost komutatorja $[\hat{A}, \hat{H}]$. Tako dobimo torej

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{A} \rangle = \left\langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right\rangle + \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{A}, \hat{H}] \rangle$$

$$\hat{A} = \hat{x} = x$$

Torej imamo

$$\frac{d\langle x \rangle}{dt} = 0 + \frac{1}{i\hbar} \left\langle \left[x, \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x, t) \right] \right\rangle$$

Potrebujemo torej komutatorje

$$[x, \hat{p}^2] = \hat{p}[x, \hat{p}] + [x, \hat{p}]\hat{p} = 2i\hbar\hat{p}$$

$$[x, V] = 0$$

Dobimo torej:

$$\frac{d\langle x \rangle}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \frac{1}{2m} 2i\hbar \langle \hat{p} \rangle = \frac{1}{m} \langle \hat{p} \rangle$$

$A = \hat{p}$
Zopet

$$\frac{d\langle \hat{p} \rangle}{dt} = m \frac{d^2 \langle x \rangle}{dt^2} = 0 + \frac{1}{i\hbar} \left\langle \left[\hat{p}, \frac{\hat{p}^2}{2m} + V \right] \right\rangle$$

Potrebujemo torej komutatorje

$$\left[\hat{p}, \frac{\hat{p}^2}{2m} \right] = 0$$

Za potencial pa vzamemo splošno funkcijo f in preverimo

$$\begin{aligned} [\hat{p}, \hat{V}]f &= (pV - Vp)f = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}(Vf) - \left(-i\hbar V \frac{\partial}{\partial x}\right)f = -i\hbar \left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)f - i\hbar \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)V + i\hbar V \frac{\partial f}{\partial x} = \\ &= i\hbar \frac{\partial V}{\partial x} f ; \quad \forall f \end{aligned}$$

Tako imamo torej

$$\frac{d\langle \hat{p} \rangle}{dt} = \frac{1}{i\hbar} (-i\hbar) \left\langle \frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle = - \left\langle \frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle$$

Oz. v 3D dobimo **Erhenfestov teorem** kot

$$m \frac{d^2 \langle \vec{r} \rangle}{dt^2} = \langle \vec{F}(\vec{r}, t) \rangle; \quad \vec{F}(\vec{r}, t) = -\nabla V(\vec{r}, t)$$

Tu se tudi pozna ključna razlika zakaj to ni nujno 2.NZ. Da bilo to enako kot klasično, bi rabil zadnji člen biti $V(\langle x \rangle)$ in ne $\langle V(x) \rangle$. Sicer sta pa lahko ta, dva zelo podobna in takrat približno velja.

Nedoločenost (širina porazdelitve)

Na podlagi veliko diskretnih meritev lahko dobimo porazdelitev. Širino te verjetnostne porazdelitve zapišemo kot

$$\sigma^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 = \langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle = (\Delta x)^2$$

To ne pomeni, da delec okoli te širine zmedeno frči. Spet nam to nič ne pove o »delcu«. To lahko izračunamo tudi za operator $(\Delta \hat{A})^2 = \langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2$ recimo Heisenberg je to naredil za operator gibalne količine. Velja

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|$$

Tako dobimo **Heisenbergov princip nedoločenosti**

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

To pomeni, da če bi merili p , $\langle p \rangle$, Δp in potem za drugi delec v isti VF x , $\langle x \rangle$, Δx bi za produkt to veljalo. To nič nima s tem, da »delec« nima definirane lege in hitrosti. Govori o širinah porazdelitev.

Formalizem kvantne mehanike

1. Vektorski prostor; Hilbertov prostor L^2

Za vsak $\psi(\vec{r}, t) \in L^2$ obstaja števna baza $\{\varphi_n\}$; $n \in \mathbb{N}_0$. Možno je sicer tudi $\{\varphi_k\}$; $k \in \mathbb{R}$ ampak to je potem Banachov in ne Hilbertov prostor.

2. Skalarni produkt

Skalarni produkt med dvema valovnima funkcijama definiramo kot

$$(\varphi, \psi) = (\varphi|\psi) = \langle \varphi, \psi \rangle = \langle \varphi|\psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi^* \psi dx$$

kjer * označuje kompleksno konjugacijo (tisti kar bi matematiki tipično s črto označili).

Lastnosti

- i) $\langle \varphi|\psi \rangle = \langle \psi|\varphi \rangle^*$
- ii) $\langle \psi|\psi \rangle \geq 0$
- iii) $\langle \psi|\psi \rangle = 0 \Leftrightarrow \psi = 0$
- iv) $|\langle \varphi|\psi \rangle|^2 \leq \langle \varphi|\varphi \rangle \langle \psi|\psi \rangle$

3. ket

Za $\psi(x, t) \in L^2$ lahko rečemo, da stanje opišemo z vektorjem v Hilbertovem prostoru L^2 . (Ne govorimo, da je to enako kot ψ).

$$|\psi\rangle \in L^2$$

4. Linearni operatorji

Za linearne operatorje mora veljati

$$\hat{A}(\lambda\psi + \mu\varphi) = \lambda\hat{A}\psi + \mu\hat{A}\varphi; \lambda, \mu \in \mathbb{C}$$

5. bra

Spomnimo se linearnega funkcionala, ki funkcijo oz. vektor preslika v število. Operator, ki iz funkcije naredi število je funkcional. $\psi(x) \in L^2 \quad \hat{f}\psi = z; z \in \mathbb{C}$ Rieszov representacijski izrek pravi

$$\forall \hat{f}\psi = z \Rightarrow \exists f_z \in L^2$$

$$z = \int f_z^*(x)\psi(x)dx = \langle f_z|\psi \rangle$$

Linearne funkcionalne pišemo z bra.

$$\hat{f}_- = \int f_z^*(x)_- dx$$

$$\langle f| \dots |\psi \rangle \rightarrow \langle f||\psi \rangle = \langle f|k \rangle \in \mathbb{C}$$

6. Razvoj stanja po dani bazi

Naj bo $\{\varphi_n\}$ (neskončno) števena ortonormirana baza. Zanj torej velja

$$\int \varphi_n^* \varphi_m dx = \delta_{n,m}$$

Razvoj po bazi naredimo kot

$$\psi(x) = \sum_n c_n \varphi_n(x)$$

Koeficiente lahko dobimo preko ortonormiranosti

$$\int \varphi_m^* \psi dx = \sum_n c_n \int \varphi_m^* \varphi_n dx = \sum_n c_n \delta_{n,m} = c_m$$

identiteto lahko zapišemo kot

$$\begin{aligned} \psi(x) &= \sum_n \left(\int_{-\infty}^{\infty} \varphi_n^* \dots dx' \right) \varphi_n \psi(x) \\ \Rightarrow I &= \sum_n \varphi_n \int \varphi_n^*(x') \dots dx' \end{aligned}$$

Ponovimo to še »po Diracu«

Bazo zapišemo kot

$$\{|\varphi_n\rangle\} = \{|n\rangle\} \rightarrow |\varphi_n\rangle = |n\rangle$$

Tako je **razvoj po bazi**

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle$$

Za dobiti koeficient množimo z leve z $\langle m|$

$$\langle m|\psi\rangle = \sum_n c_n \langle m|n\rangle = \sum_n c_n \delta_{n,m} = c_m$$

Velja

$$|\psi\rangle = \sum_n \langle n|\psi\rangle |n\rangle = \sum_n |n\rangle \langle n|\psi\rangle = \left(\sum_n |n\rangle \langle n| \right) |\psi\rangle$$

Tako je **identiteta** »po Diracu«

$$I = \sum_n |n\rangle \langle n|; \quad I\psi = \psi$$

7. Zapis operatorja v dani bazi

Imejmo operator $\hat{A}|\psi\rangle = |\psi_1\rangle$ in bazo $\{|n\rangle\}$. Vrinemo kompletni sistem v delovanje operatorja

$$\hat{A}|\psi\rangle = I\hat{A}I|\psi\rangle = \sum_m |m\rangle\langle m| \hat{A} \sum_n |n\rangle\langle n| |\psi\rangle = \sum_{m,n} |m\rangle A_{mn} \langle n|\psi\rangle$$

kjer smo uvedli **matrični element**

$$A_{mn} = \langle m|\hat{A}|n\rangle$$

Tako je **zapis operatorja v dani bazi**

$$\hat{A} = \sum_{m,n} |m\rangle A_{mn} \langle n|$$

Konkretno lahko to računamo kot

$$\hat{A}|\psi\rangle = \sum_{m,n} |m\rangle A_{mn} \langle n| \sum_k c_k |k\rangle = \sum_{m,n} |m\rangle A_{mn} c_n = \sum_m d_m |m\rangle = |\psi_1\rangle$$

Matrično pa to pomeni

$$\hat{A}|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \rightarrow \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots \\ A_{21} & A_{22} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_m \end{pmatrix}$$

8. Hermitski ali simetrični operatorji

Simetričnost ali hermitskost pomeni

$$\langle \varphi|A|\psi\rangle = \langle \varphi|A\psi\rangle = \langle A\varphi|\psi\rangle$$

Lastnosti simetričnih operatorjev

i) **Lastne vrednosti so realne**

$$A|\psi\rangle = a|\psi\rangle$$

Pomnožimo to z ψ iz leve

$$\begin{aligned} \langle \psi|A|\psi\rangle &= a\langle \psi|\psi\rangle \\ \langle A\psi|\psi\rangle &= \langle \psi|A\psi\rangle = \langle \psi|A|\psi\rangle = a\langle \psi|\psi\rangle \in \mathbb{R} \\ &\Rightarrow a \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

ii) **Lastni vektorji so med seboj ortogonalni**

Imejmo

$$\begin{aligned} A|\psi\rangle &= a|\psi\rangle \\ A|\varphi\rangle &= b|\varphi\rangle \end{aligned}$$

Križno pomnožimo enačbi iz leve in potem drugo enačbo konjugiramo. Dobimo

$$\begin{aligned} \langle \varphi|A|\psi\rangle &= a\langle \varphi|\psi\rangle \quad (1) \\ \langle \psi|A|\varphi\rangle^* &= b\langle \varphi|\psi\rangle \end{aligned}$$

Člen druge enačbe lahko zapišemo tudi kot (**in take trike se stalno uporablja!**). Pri zelenem enačaju uporabimo lastnost simetričnosti.

$$\langle \psi|A|\varphi\rangle^* = \langle \psi|A\varphi\rangle^* = \langle A\varphi|\psi\rangle = \langle \varphi|A\psi\rangle = \langle \varphi|A|\psi\rangle$$

Torej je druga enačba pravzaprav

$$\langle \varphi | A | \psi \rangle = b \langle \varphi | \psi \rangle \quad (2)$$

Sedaj pa odštejemo drugo enačbo od prve in dobimo

$$0 = (a - b) \langle \varphi | \psi \rangle$$

Iz tega sledi če $a \neq b$, da je

$$\langle \varphi | \psi \rangle = 0$$

Če so vse lastne vrednosti nekega operatorja realne, ta ni nujno hermitski.

9. Hermitsko adjungirani operator

Imejmo $A, B, |\psi\rangle, |\varphi\rangle$. Za hermitsko adjungirane operatorje velja

$$\langle \varphi | A \psi \rangle = \langle B \varphi | \psi \rangle$$

Po domače povedano je hermitsko adjungirani operator »enak kot A samo na levi v bra«. To označimo z bodalom/dagger (to je tisto kar bi matematiki tipično označili z *).

$$B = A^\dagger$$

Lastnosti

Naj bosta A, B operatorja

i) Moženje operatorja s skalarjem

$$A = zB$$

$$\begin{aligned} \langle A^\dagger \varphi | \psi \rangle &= \langle \varphi | A | \psi \rangle = \langle \varphi | zB | \psi \rangle = z \langle \varphi | B | \psi \rangle = z \langle B^\dagger \varphi | \psi \rangle = \langle \psi | B^\dagger | \varphi \rangle^* = \langle z^* B^\dagger \varphi | \psi \rangle \\ \Rightarrow A &= zB \quad A^\dagger = z^* B^\dagger \end{aligned}$$

ii) $A = |m\rangle\langle n|$

$$\begin{aligned} \langle \varphi | A | \psi \rangle &= \langle \varphi | m \rangle \langle n | \psi \rangle = (\langle \psi | n \rangle \langle m | \varphi \rangle)^* = \langle A^\dagger \varphi | \psi \rangle \\ \Rightarrow A^\dagger &= |n\rangle\langle m| \end{aligned}$$

iii) $(\mu A + \lambda B)^\dagger = \mu^* A^\dagger + \lambda^* B^\dagger$

iv) Produkt operatorjev $(AB)^\dagger$

$$\begin{aligned} \langle \varphi | AB | \psi \rangle &= \langle A^\dagger \varphi | B \psi \rangle = \langle B^\dagger A^\dagger \varphi | \psi \rangle \\ \Rightarrow (AB)^\dagger &= B^\dagger A^\dagger \end{aligned}$$

v) Projektor (sam sebi adjungiran operator)

$$P_n = |n\rangle\langle n| = P_n^\dagger$$

So idempotentni operatorji

$$P_n^2 = P_n P_n = |n\rangle\langle n|n\rangle\langle n| = P_n; \quad I = \sum_n P_n$$

10. Kako najdemo A^\dagger , če poznamo A ?

Imejmo operator razvit po bazi

$$A = \sum_{m,n} |m\rangle A_{mn} \langle n|$$

$$A^\dagger = \sum_{m,n} |n\rangle A_{mn}^* \langle m| = \sum_{m,n} |m\rangle A_{nm}^* \langle n|$$

Torej moramo **transponirati in konjugirati** $A_{mn}^\dagger = A_{nm}^*$

11. Sebi adjungirani operatorji

Naj velja

a) $\langle \varphi | A | \psi \rangle = \langle A \varphi | \psi \rangle$ (hermitski simetričen)

b) $A = A^\dagger$

Mora veljati a) in da sta **domeni enaki** $\mathcal{D}(A) = \mathcal{D}(A^\dagger)$. Tedaj obstaja baza $\{|n\rangle\}$; $A|n\rangle = a_n|n\rangle$

Dva zanimiva primera v zvezku

12. Unitarni operatorji

Za **unitarni operator** velja

$$U^{-1} = U^\dagger$$

$$U^{-1}U = UU^{-1} = I = U^\dagger U = UU^\dagger$$

Lastnosti

i) **Unitarni operatorji ohranjajo skalarni produkt**

Imejmo

$$U|\varphi\rangle = |\tilde{\varphi}\rangle; \quad |\varphi\rangle = U^{-1}|\tilde{\varphi}\rangle = U^\dagger|\tilde{\varphi}\rangle$$

$$U|\psi\rangle = |\tilde{\psi}\rangle; \quad |\psi\rangle = U^{-1}|\tilde{\psi}\rangle = U^\dagger|\tilde{\psi}\rangle$$

Izračunajmo skalarni produkt

$$\langle \varphi | \psi \rangle = \langle U^\dagger \tilde{\varphi} | U^\dagger \tilde{\psi} \rangle = \langle \tilde{\varphi} | UU^\dagger | \tilde{\psi} \rangle = \langle \tilde{\varphi} | \tilde{\psi} \rangle$$

ii) **Transformacija oz. zamenjava baze**

$$\langle \varphi | A | \psi \rangle = \langle U^\dagger \tilde{\varphi} | A | U^\dagger \tilde{\varphi} \rangle = \langle \tilde{\varphi} | UAU^\dagger | \tilde{\psi} \rangle = \langle \tilde{\varphi} | \tilde{A} | \tilde{\psi} \rangle$$

kjer smo transformirali bazo operatorja kot

$$\tilde{A} = UAU^\dagger$$

iii) $A = \mu B + \lambda CD$

Pretransformiramo tako da pomnožimo y U iz leve in U^\dagger iz desne. Dobimo

$$\tilde{A} = \mu \tilde{B} + \lambda \tilde{C} \tilde{D}$$

iv) Če velja $K = K^\dagger \Rightarrow U = e^{iK}$ je **unitaren**.

a. $UU^\dagger = e^{iK} e^{-iK} = I$

b. Imejmo enoparametrični unitarni operator $U(s)$ takrat

$$\exists K = K^\dagger: U(s) = e^{isK}$$

13. Časovni razvoj kvantnega stanja

Stacionarna stanja

Imejmo stacionarno stanje $H \neq H(t)$. Torej imamo

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(\vec{r}) \quad i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi; \quad \Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r})f(t)$$

$$\Rightarrow i\hbar \psi(\vec{r}) \frac{\partial f}{\partial t} = H\psi f$$

To delimo z ψf in dobimo

$$i\hbar \left(\frac{df}{dt} \right) \frac{1}{f} = \frac{1}{\psi} H\psi = \text{konst.} = E$$

Leva stran je odvisna samo od t , desna pa samo od x , torej sta strani konstantni.

$$\Rightarrow \Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}) e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$$

Velja $|\Psi|^2 = |\psi|^2$ in $H\psi_n(\vec{r}) = E_n\psi_n(\vec{r})$ tvorijo bazo.

Splošno

Imejmo bazo $\{|\varphi_n\rangle\}$. Velja torej $H|\varphi_n\rangle = E_n|\varphi_n\rangle$. Časovni razvoj nekega stanja ψ lahko naredim kot

$$|\psi(t)\rangle \Big|_0 = \sum_n |\varphi_n\rangle \langle \varphi_n | \psi(0) \rangle = \sum_n c_n |\varphi_n\rangle$$

Stanje $|\varphi_n\rangle$ se pa spreminja tako kot smo pokazali pri prejšnji točki. Torej je **časovni razvoj**

$$\Psi(\vec{r}, t) = \sum_n c_n e^{-i\frac{E_n}{\hbar}t} \varphi_n(\vec{r})$$

Unitarni operator časovnega razvoja pa zapišemo kot

$$U(t) = e^{-i\frac{H}{\hbar}t}$$

kjer velja $e^{-i\frac{E_n}{\hbar}t} = e^{-i\frac{H}{\hbar}t}$ ker je to $\exp(H) = \exp(E_n)$ funkcija na operatorju. Torej lahko funkcijo v času razvijemo kot

$$\Psi(\vec{r}, t) = e^{-i\frac{H}{\hbar}t} \psi(\vec{r}, 0)$$

Translacija v času (in posrečeno izpeljava SE)

Translacijo v času naredimo kot

$$U(t_2, t_1) = e^{-i\frac{H}{\hbar}(t_2 - t_1)}$$

$$\Psi(\vec{r}, t_2) = U(t_2, t_1) \psi(\vec{r}, t_1)$$

Poglejmo

$$\begin{aligned} \delta\Psi(\vec{r}, t) &= \Psi(\vec{r}, t + dt) - \Psi(\vec{r}, t) = U(t + dt, t) \Psi(\vec{r}, t) = \\ &= \left(1 - i\frac{H}{\hbar}dt + \mathcal{O}(H^2) \right) \Psi(\vec{r}, t) - \Psi(\vec{r}, t) \\ &\Rightarrow \frac{d\Psi(\vec{r}, t)}{dt} = -i\frac{H}{\hbar} \Psi(\vec{r}, t) \rightarrow i\hbar \frac{\partial\Psi}{\partial t} = H\Psi \end{aligned}$$

Torej lahko stacionarno SE izpeljemo samo iz tega, da je časovni razvoj unitaren.

14. Reprezentacija p in x

Spomnimo se Fourierove transformacije

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(k) e^{ikx} dk$$

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x') e^{-ikx'} dx'$$

Vstavimo eno v drugo:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x') e^{-ikx' + ikx} dx' dk = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x') f(x') dx'$$

Kjer je **Diracova delta funkcija** (ki ni funkcija, ker sama po sebi ne obstaja)

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} dk$$

Lastna stanja p

Prosti delec $V(x) = 0$, torej imamo enačbo

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi\rangle = \frac{\hat{p}^2}{2m} |\psi\rangle$$

Imejmo še lastna stanja operatorja gibalne količine $|\varphi_p\rangle = |p\rangle$

$$\hat{p}|\varphi_p\rangle = p|\varphi_p\rangle; \quad p \in \mathbb{R}$$

Poglejmo osnovno lastno stanje

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \varphi_{p_0}(x) = p_0 \varphi_{p_0}(x) \Rightarrow \varphi_{p_0} = C e^{i\frac{p_0}{\hbar}x}$$

Tega stanja ne moremo normirati, da bi določili konstantno. Dirac je predlagal nov način normalizacije takih funkcij, kjer uporabimo integralni zapis funkcije δ in upoštevamo $\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{p_0}^* \varphi_p dx = \delta(p - p_0) \Rightarrow C = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}$$

Torej je osnovno lastno stanje

$$\varphi_{p_0} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{i\frac{p_0}{\hbar}x}$$

in $\langle p_0 | p \rangle = \delta(p - p_0) = \delta(p_0 - p)$. To je primer števnice baze.

$$\psi(x) = \int \tilde{\psi}(p) \varphi_p(x) dp$$

$$\tilde{\psi}(p) = \int \psi(x) \varphi_p^*(x) dx$$

Kar to pomeni je, da je FT unitarna operacija. Kljub temu, da so bazni vektorji nenormirani je možno valovno funkcijo normirati saj velja **Parsevalova enačba**

$$\int |\psi|^2 dx = \int |\tilde{\psi}|^2 dp$$

Operatorja x in p se pri FT ravno obrneta (in predznak)

Razvijmo stanje po lastnih stanjih, ki niso več stacionarna za $V(x) \neq 0$, a vseeno tvorijo bazo ($\tilde{\psi}$ je amplituda razvoja)

$$\hat{p}\psi(x) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi(x) = \int \tilde{\psi}(p) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \varphi_p(x) \right) dp = \int (p\tilde{\psi}(p)) \varphi_p(x) dp$$

Torej to pomeni

$$\left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right)^n \psi(x) = \hat{p}^n \psi(x) = p^n \tilde{\psi}(p)$$

Poglejmo še

$$\hat{x}\psi(x) = x\psi(x) = \int \tilde{\psi}(p) x \varphi_p(x) dp =$$

Prepoznamo, da je $x e^{xp}$ isto kot odvod tega po p in tako dobimo

$$= \int \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \tilde{\psi} \right) \varphi_p(x) dp$$

To torej pomeni

$$x^n \psi(x) = \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \right)^n \tilde{\psi}(p)$$

Torej se pri FT operatorja ravno »obrnete« in še spremeni se predznak.

Lastne funkcije x

$$\hat{x}\psi_0(x) = x\psi_0(x) = x_0\psi_0(x)$$

Razvijemo stanje po lastnih funkcijah in uporabimo prej izpeljano za FT operatorja x

$$x \int \tilde{\psi}(p) \varphi_p(x) dp = \int \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \tilde{\psi}_0(p) \right) \varphi_p(x) dp$$

Torej mora veljati

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \tilde{\psi}(p) = x_0 \tilde{\psi}(p)$$

Tako je torej FT lastne funkcije koordinate

$$\tilde{\psi}_0(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-i\frac{p}{\hbar}x} = \varphi_p^*(x)$$

Opazimo, da je ravno konjugirano kot osnovno lastno stanje operatorja p . To lahko transformiramo nazaj

$$\psi_0(x) = \int \varphi_p(x_0) \varphi_p(x) dp = \delta(x - x_0)$$

Torej je lastna funkcija koordinate

$$x\delta(x - x_0) = x_0\delta(x - x_0)$$

15. Verjetnostni amplitudi $\langle p|\psi\rangle$ in $\langle x|\psi\rangle$

Za operator p

Imejmo $|\psi\rangle \in L^2$. Lahko ga razvijemo po lastnih stanjih operatorja p (ravni vali)

$$|\psi\rangle = \int \tilde{\psi}(p)|p\rangle dp$$

To pomnožimo z $\langle p_1|$

$$\langle p_1|\psi\rangle = \int \tilde{\psi}(p)\langle p_1|p\rangle dp = \int \tilde{\psi}(p)\delta(p - p_1) dp = \tilde{\psi}(p_1)$$

Torej je **verjetnostna amplituda**

$$\tilde{\psi}(p) = \langle p|\psi\rangle \in \mathbb{C}$$

Za operator x

Naredimo analogno in razvijemo po lastnih stanjih p

$$|\psi\rangle = \int \tilde{\psi}(p)|p\rangle dp$$

$$\langle x_0|\psi\rangle = \int \tilde{\psi}(p)\langle x_0|p\rangle dp = \int \tilde{\psi}(p)\varphi_p(x_0) dp = \psi(x_0)$$

Torej je **verjetnostna amplituda**

$$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle \in \mathbb{C}$$

Alternativen zapis za identiteto

Tako kot smo lahko v števnici bazi zapisali identiteto kot $I = \sum_n |n\rangle\langle n|$ lahko to storimo tudi tu z integralom.

$$I = \int |p\rangle\langle p| dp = \int |x\rangle\langle x| dx$$

Torej

$$|\psi\rangle = \int |p\rangle\langle p|\psi\rangle dp = \int \tilde{\psi}(p)|p\rangle dp$$

$$|\psi\rangle = \int |x\rangle\langle x|\psi\rangle dx = \int \psi(x)|x\rangle dx$$

Tu je v zvezku nek primer

16. Kompleten sistem med sabo komutirajočih operatorjev

Imamo A, B in komutirata, to pomeni, da obstaja takšna baza, da je lastna obema hkrati.

$$[A, B] = 0 \Leftrightarrow \exists \{|n\rangle\}: \begin{cases} A|n\rangle = a_n|n\rangle \\ B|n\rangle = b_n|n\rangle \end{cases}$$

To velja tudi v drugo smer. Če najdemo bazo, ki je večim operatorjem lastna potem ti operatorji med sabo komutirajo. To vse velja za tudi več kot 2 operatroja. Vsi skupaj sestavljajo **kompleten sistem operatorjev**.

17. Postulati kvantne mehanike (Kopenhagenska interpretacija)

1. **Kvantni sistem je opisan z vektorjem $|\psi\rangle$ v Hilbertovem prostoru**
2. **Vsaka opazljivka (merljiva količina) je hermitski operator; $A = A^\dagger$**
3. **Pričakovane vrednosti so $\langle\psi|A|\psi\rangle$**
4. **Dinamika (časovni razvoj)**

$$i\hbar \frac{d}{dt} = H|\psi\rangle; |\psi(t)\rangle = U(t, 0)|\psi(0)\rangle$$

5. **O meritvi: Pri posamezni meritvi A je rezultat ena od lastnih vrednosti. Verjetnost, da izmerimo natanko neko lastno vrednost je**

$$P_a = |c_a|^2; c_a = \langle a|\psi\rangle$$

Oz.

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle; P_n = |c_n|^2$$

Kolaps valovne funkcije: Po izvedeni meritvi je kvantni sistem v stanju $|a\rangle$ (pripadajoč tisti lastni vrednosti ki smo jo izmerili)

Še en dodatek

$$\int \delta(x - x_0)\delta(x - x_1)dx = \delta(x_1 - x_0)$$

Primer prostega pada

Imejmo potencial, ki ustreza gravitacijskemu $V(x) = mgx$. Rešujemo

$$\frac{\hat{p}^2}{2m}\psi + mgx\psi = E\psi$$
$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \tilde{\psi}(p)e^{i\frac{p}{\hbar}x} dp$$

Transformiranka SE je

$$\frac{p^2}{2m}\tilde{\psi} + mgi\hbar \frac{\partial \tilde{\psi}}{\partial p} = E\tilde{\psi}$$
$$\Rightarrow \tilde{\psi}(p) = C \exp\left(\left(\frac{p^3}{6} + mE_p\right)(\hbar gm^2)\right)$$
$$\Rightarrow \psi(x) = Ai(x)$$

Harmonski oscilator

Rešujemo

$$E = H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2$$
$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega x^2 =$$

Vzamemo za novo spremenljivko $\xi^2 = \hbar/\omega m$

$$= \frac{1}{2} \hbar\omega \left(\frac{x^2}{\xi^2} - \xi^2 \frac{d^2}{dx^2} \right) =$$

Naredimo razliko kvadratov $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ ampak pazimo $ab \neq ba$

$$= \frac{1}{4} \hbar\omega \left(\left(\frac{x}{\xi} + \xi \frac{d}{dx} \right) \left(\frac{x}{\xi} - \xi \frac{d}{dx} \right) + \left(\frac{x}{\xi} - \xi \frac{d}{dx} \right) \left(\frac{x}{\xi} + \xi \frac{d}{dx} \right) \right) = (*)$$

Vpeljemo **anhilacijski in kreacijski operator**

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{x}{\xi} + \xi \frac{d}{dx} \right) = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x + \frac{i}{m\omega} p \right)$$

$$\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{x}{\xi} - \xi \frac{d}{dx} \right)$$

Z njima lahko izrazimo x in p (oz. odvod po x)

$$x = \frac{\xi}{\sqrt{2}} (a + a^\dagger) = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (a + a^\dagger)$$

$$\frac{d}{dx} = \frac{1}{\xi\sqrt{2}} (a - a^\dagger) = i \sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}} (a^\dagger - a)$$

Tako dobimo

$$(*) = \frac{1}{2} \hbar\omega (aa^\dagger + a^\dagger a)$$

Komutator med a in a^\dagger

$$[a, a^\dagger] = aa^\dagger - a^\dagger a = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{\xi} + \xi \frac{d}{dx} \right) \left(\frac{x}{\xi} - \xi \frac{d}{dx} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{x}{\xi} - \xi \frac{d}{dx} \right) \left(\frac{x}{\xi} + \xi \frac{d}{dx} \right) =$$
$$= \frac{1}{2} \left(\frac{d}{dx} x - x \frac{d}{dx} + \frac{d}{dx} x - x \frac{d}{dx} \right) = \left[\frac{d}{dx}, x \right] = - \left[x, -\frac{1}{i\hbar} \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right) \right] = \frac{1}{i\hbar} [x, p] = 1$$

Torej lahko izrazimo $aa^\dagger = 1 + a^\dagger a$ v **normalnem vrstnem redu**.

Tako je torej **hamiltonian**

$$H = \hbar\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right)$$

Operator štetja

$$\hat{n} = a^\dagger a; \hat{n}^\dagger = a^\dagger a$$

$$H = \hbar\omega \left(\hat{n} + \frac{1}{2} \right)$$

Poiščimo lastne vrednosti

$$\hat{n}|\varphi_\lambda\rangle = \lambda|\varphi_\lambda\rangle \quad | \cdot \langle \varphi_\lambda |$$

$$\langle \varphi_\lambda | \hat{n} | \varphi_\lambda \rangle = \langle \varphi_\lambda | a^\dagger a | \varphi_\lambda \rangle = \langle a \varphi_\lambda | a \varphi_\lambda \rangle = \lambda \langle \varphi_\lambda | \varphi_\lambda \rangle \geq 0$$

Je **pozitivno semidefiniten**. Torej je $\lambda \geq 0$. Ali je $\lambda = 0$ rešitev?

$$a^\dagger a |\varphi_0\rangle = 0$$

$$a |\varphi_0\rangle = 0; \langle x | \varphi_0 \rangle = \varphi_0(x)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{x}{\xi} + \xi \frac{d}{dx} \right) \varphi_0(x) = 0$$

$$\Rightarrow \varphi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{\sqrt{\pi}\xi}} e^{-\frac{1x^2}{2\xi^2}}$$

Torej je rešitev.

Komutatorji z operatorjem štetja

$$[\hat{n}, a^\dagger] = a^\dagger [a, a^\dagger] + [a^\dagger, a^\dagger] a = a^\dagger$$

$$[\hat{n}, a] = a^\dagger [a, a] + [a^\dagger, a] a = -a$$

Kaj dela kreacijski operator?

Viša stanje. Naj bo $\hat{n}|\varphi_\lambda\rangle = \lambda|\varphi_\lambda\rangle$ rešitev.

$$\hat{n}a^\dagger|\varphi_\lambda\rangle = (a^\dagger\hat{n} + a^\dagger)|\varphi_\lambda\rangle = (\lambda + 1)a^\dagger|\varphi_\lambda\rangle = (\lambda + 1)c_\lambda|\varphi_{\lambda+1}\rangle$$

Vsa cela nenegativna števila so rešitve $\lambda = 0, 1, 2, \dots, n$. Če je $|\varphi_n\rangle$ normirana rešitev potem je

$$|\varphi_{n+1}\rangle = \frac{1}{\sqrt{n+1}} a^\dagger |\varphi_n\rangle$$

$$|\varphi_n\rangle = \frac{a^\dagger}{\sqrt{n+1-1}} |\varphi_{n-1}\rangle$$

$$\Rightarrow |\varphi_n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} a^{\dagger n} |\varphi_0\rangle$$

Kaj dela anihilacijski operator?

Niža stanje.

$$\hat{n}a|\varphi_n\rangle = (a\hat{n} - a)|\varphi_n\rangle = (n-1)a|\varphi_n\rangle = (n-1)c_n|\varphi_{n-1}\rangle$$

$$\frac{a^n}{\sqrt{(n+1)!}}|\varphi_n\rangle = |\varphi_0\rangle$$

Kaj pa necele lastne vrednosti?

Preverimo še ali obstaja za dani n razen $|\varphi_n\rangle$ še kakšno stanje $|\tilde{\varphi}_n\rangle$. Vsekakor mora tudi ta to stanje veljati enačba anihilacijskega operatorja $a^n|\tilde{\varphi}_n\rangle \propto |\tilde{\varphi}_0\rangle$, zato je nedegenerirana energija za vsak $n \in \mathbb{N}$. Pokažimo še, da so lastne vrednosti le cele. Vzemimo $\lambda = n + \nu$, $0 < \nu < 1$ in delujemo $(n+1)$ -krat na stanje $|\varphi_n\rangle$. V zadnjem koraku lastna vrednost postane negativna, kar smo pa prej pokazali da ne gre.

$$\hat{n}a^{n+1}|\varphi_\lambda\rangle = (\nu-1)a^{n+1}|\varphi_\lambda\rangle$$

Koordinatna reprezentacija

V koordinatni reprezentaciji so lastne funkcije Hermitovi polinomi pomnoženi z Gaussovo funkcij in jih lahko zgradimo po enačbi

$$\langle x|\varphi_0\rangle = \varphi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{x}{\xi} - \xi \frac{d}{dx} \right)^n \varphi_0(x)$$

Splošen harmonski oscilator

Imejmo $\alpha = 1, 2, 3$

$$H = \sum_{\alpha=1}^N \left(\frac{p_\alpha^2}{2m} + \frac{1}{2} k_\alpha x_\alpha^2 \right)$$

$$H = \sum_{\alpha} \hbar\omega_{\alpha} \left(\hat{n}_{\alpha} + \frac{1}{2} \right); \quad [a_{\alpha}, a_{\beta}^{\dagger}] = \delta_{\alpha\beta}$$

Koherentno stanje

Je stanje LHO, ki najbolj oponaša obnašanje klasičnega harmonskega oscilatorja. Koherentno stanje je lastno stanje anihilacijskega operatorja

$$a|\varphi_{\alpha}\rangle = \alpha|\varphi_{\alpha}\rangle; \quad \alpha = e^{i\delta}|\alpha| \in \mathbb{C}$$

Valovni paket

Valovni paket definiramo kot

$$\psi(x, t) = \int \tilde{\psi}(p) e^{i\left(\frac{k}{\hbar}x - i\frac{p^2}{2m\hbar}t\right)} dp$$

Hitrost paketa je skrita v valovni dolžini oz. frekvenci oscilacije znotraj ovojnice. Ko se paket približa neki oviri, se pojavi interferenca. Interferenčne črte dobimo, ker se del valovanja že odbija in interferira z še prihajajočim.

Simetrije (in simetrijske operacije)

Translacija (premik)

$$U(s)\psi(x) = \tilde{\psi}(x) = \psi(x-s) = \psi(x) - s \frac{d}{dx} \psi + \frac{s^2}{2!} \frac{d^2}{dx^2} \psi^2 \mp \dots = \left(1 - s \frac{d}{dx} \pm \dots\right) \psi(x)$$

Tako **unitarni operator premika** definiramo kot

$$U(s) = e^{-i \frac{s}{\hbar} p}$$

oz. v splošnem

$$U(\vec{s}) = e^{-i \frac{\vec{s} \cdot \vec{p}}{\hbar}} = e^{iK}$$

kjer je \vec{p} **generator transformacije**.

Kako se spremeni pričakovana vrednost $\langle x \rangle$?

$$\tilde{x} = U^\dagger x U = e^{i \frac{sp}{\hbar}} x e^{-i \frac{sp}{\hbar}} =$$

uporabimo Baker-Hausdorfovo lemo

$$= x + \left[\frac{isp}{\hbar}, x \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{isp}{\hbar}, \left[\frac{isp}{\hbar}, x \right] \right] + \dots = x + s$$

$$\langle x \rangle = \langle \tilde{\psi} | x | \tilde{\psi} \rangle = \langle \psi(x-s) | x | \psi(x-s) \rangle = \langle U\psi | x | U\psi \rangle = \langle \psi | U^\dagger x U | \psi \rangle = \langle x \rangle \Big|_{s=0} + s$$

Rotacija (vrtenje)

Hočemo

$$\tilde{\psi}(\vec{r}) = \psi(\vec{r} - d\vec{r}) =$$

$$\vec{\varphi} = \varphi \vec{n} \text{ in } d\vec{r} = d\varphi \hat{n} \times \vec{r}$$

$$= \left(I - i d\varphi \frac{(\hat{n} \times \vec{r}) \cdot \vec{p}}{\hbar} + \mathcal{O}(d\varphi^2) \right) \psi(\vec{r})$$

Torej je

$$U(\varphi) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(I - i \frac{\varphi}{N} \frac{(\hat{n} \times \vec{r}) \cdot \vec{p}}{\hbar} \right)$$

Velja pa $(\hat{n} \times \vec{r}) \cdot \vec{p} = \hat{n} \cdot (\vec{r} \times \vec{p}) = \hat{n} \cdot \vec{L}$ kjer smo definirali **vrtilno količino** $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$. Znana pa je tudi

limita $\lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{N} \right)^N = e^x$. Tako je torej **unitarni operator rotacije**

$$U(\varphi) = e^{-i \frac{\varphi \cdot \vec{L}}{\hbar}}$$

Inverzija prostora (parnost)

$$\mathcal{P}f(\vec{r}) \rightarrow f(-\vec{r})$$

Torej $\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$, $\nabla \rightarrow -\nabla$, $\nabla^2 \rightarrow \nabla^2$. Kaj pa $V(\vec{r}) \rightarrow V(-\vec{r})$?

Naj velja $V(x) = V(-x)$. V stacionarnem stanju imamo

$$H\psi(x) = E\psi(x)$$

$$\mathcal{P}H\psi = H\mathcal{P}\psi = \mathcal{P}E\psi = E\mathcal{P}\psi$$

Očitno vidimo, da če je ψ rešitev je tudi $\mathcal{P}\psi$. Definiramo lahko

$$\psi_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi(\vec{r}) \pm \psi(-\vec{r}))$$

$$\mathcal{P}\psi_{\pm} = \pm\psi_{\pm}$$

Če E ni degeneriran (sod potencial?) je ψ soda **ali** liha. Vezana stanja imajo energijo, ki ni degenerirana.

Obrat časa

Klasično lahko obrnemo čas čisto preprosto $\frac{d^2\vec{r}(-t)}{d(-t)^2} = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2}$. Sicer pa v resnici zaradi entropijskega zakona stvari niso simetrične na čas- Bistvo entropijskega zakona je, da ne moremo obrniti časa.

Poglejmo problem kvantno. Predpostavimo $V(\vec{r})$ in ne $V(\vec{r}, t)$. Rešujemo torej

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}, t) = H\psi(\vec{r}, t)$$

Sedaj naredimo $t \rightarrow -t$ in konjugiramo, kjer predpostavimo $H^* = H$.

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\vec{r}, -t)}{\partial(-t)} = H\psi(\vec{r}, -t) \quad |^*$$

$$+i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi^*(\vec{r}, -t) = H\psi^*(\vec{r}, -t)$$

Torej če je $\psi(\vec{r}, t)$ rešitev je tudi $\psi^*(\vec{r}, -t)$. Naj bo torej **operator obrata časa** (oz. operator spremembe smeri gibanja)

$$\tau\psi = \psi^*; \quad \tau = K$$

$$Kz = z^*K; \quad z \in \mathbb{C}$$

Torej je samo konjugacija. $-t$ **moramo vstaviti ročno!**

$$\psi(\vec{r}, t) \rightarrow \tau\psi(\vec{r}, -t)$$

V klasični mehaniki pa ta operator nič ne naredi.

Transformacija ravnega vala

$$\psi_p = e^{\frac{ipx}{\hbar} - \frac{iEt}{\hbar}}$$

$$\tilde{\psi}(x, t) = \tau\psi(x, -t) = e^{-\frac{ipx}{\hbar} - \frac{iEt}{\hbar}}$$

Transformacija stacionarnega stanja $\psi(\vec{r})$

$$H\psi = E\psi \quad | \cdot \tau$$

$$H\tau\psi = \tau H\psi = E\tau\psi$$

Torej če je ψ rešitev je tudi ψ^* spet rešitev. Sestavimo ju lahko skupaj

$$\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi + \psi^*)$$

Če energija ni degenerirana (in je H invarianten na obrat časa (torej ni magnetnih polj)) so rešitve realne in velja

$$\psi^* = e^{i\delta}\psi; \quad \psi \in \mathbb{R}$$